

УДК 519.21

***М. В. Працьовитий, Р. В. Кривошия,  
О. П. Макарчук***

<sup>1</sup>*НПУ імені М. П. Драгоманова, Інститут математики НАН України, Київ; prats444@gmail.com*

<sup>2</sup>*НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ; vikasvat2013@gmail.com*

<sup>3</sup>*Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, м. Кропивницький; takolpet@gmail.com*

## **Перетворення та дискретні динамічні системи на $[0; 1]$ , що зберігають рівномірний розподіл послідовностей**

### **Key words:**

В роботі розглядається ряд достатніх умов збереження властивості рівномірного розподілу послідовностей для функцій, що діють з  $[0; 1]$  в  $R$ . Досліджується зв'язок між  $Q_2$ -нормальними числами та послідовностями, продукованими оператором зсуву по відношенню до відповідних чисел.

### **Ключові слова:**

## 1. Вступ

Послідовність  $(x_n)$  називається рівномірно розподіленою за модулем 1, якщо для довільного інтервалу  $(a; b) \subset [0; 1]$  виконується умова

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n((a; b))}{n} = b - a,$$

де  $N_n((a; b))$  — кількість чисел серед  $\{x_1\}, \{x_2\}, \dots, \{x_n\}$ , які належать інтервалу  $(a; b)$ .

Нехай  $(q_0; q_1)$  — стохастичний вектор з строго додатними координатами. Відомо [2], що для довільного дійсного числа  $x \in [0; 1]$  існує нескінченний двійковий вектор  $(\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_n; \dots)$  такий, що

$$x = \beta_{\alpha_1} + \beta_{\alpha_2} q_{\alpha_1} + \beta_{\alpha_3} q_{\alpha_2} q_{\alpha_1} + \dots + \beta_{\alpha_{n+1}} q_{\alpha_n} q_{\alpha_{n-1}} \dots q_{\alpha_1} + \dots, \quad (1)$$

де  $\beta_0 = 0, \beta_1 = q_0$ .

Представлення (1) називається  $Q_2$ -представленням числа  $x$  і має наступне зображення:

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n \dots}^{Q_2}.$$

Якщо  $q_0 = \frac{1}{2}$ , то отримаємо класичне двійкове зображення з відповідним представленням:

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n \dots}^2 = \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\alpha_j}{2^j}.$$

Існує зчисленна множина чисел виду  $\Delta_{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_k 1(0)}^{Q_2}$ , які мають 2 зображення (і відповідно представлення):

$$\Delta_{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_k 1(0)}^{Q_2} = \Delta_{\gamma_1 \dots \gamma_k 0(1)}^{Q_2},$$

для всіх інших чисел з відрізка  $[0; 1]$  відповідне представлення однозначне.

Вперше поняття рівномірно розподіленої послідовності ввів Герман Вейль в 1919-му році в роботі [6], де він обґрунтував рівномірну розподіленість послідовності  $\{n\gamma\} (\gamma \notin \mathbb{Q})$ .

**Означення 1.** Число

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n \dots}^2 = \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\alpha_j}{2^j}$$

називається слаборнормальним за основою 2, якщо

$$\frac{w_k}{k} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (k \rightarrow \infty),$$

де  $w_k$  — кількість нулів серед чисел  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ .

**Означення 2.** Число

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n \dots}^2 = \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\alpha_j}{2^j}$$

називається нормальним за основою 2, якщо для довільного двійкового вектора  $(c_1; c_2; \dots; c_r)$  виконується умова:

$$\frac{w_k}{k} \rightarrow \frac{1}{2^r} \quad (k \rightarrow \infty),$$

де  $w_k$  — кількість блоків цифр  $(c_1; c_2; \dots; c_r)$ , серед набору цифр  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ .

Останні два означення ввів Еміль Борель [4]. В роботі [9] показано, що число  $x$  є нормальним за основою 2 тоді і тільки тоді, коли послідовність  $\{2^n x\}$  рівномірно розподілена на відрізку  $[0; 1]$ . Останній факт в термінах дискретних динамічних систем означає, що орбіта точки  $t$  породжена функцією  $T(x) = \{2x\}$  є рівномірно розподіленою послідовністю лише тоді, коли  $t$  є нормальним за основою 2 числом. Цілком природною є проблема поглиблення відповідного результату для  $\mathbb{Q}_2$ -представлення дійсних чисел.

## 2. Перетворення, що зберігають рівномірний розподіл послідовностей відрізка $[0; 1]$ .

**Означення 3.** Будемо говорити, що функція  $\varphi(x): [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$  задовольняє властивість *SUD* (save uniform distribution), якщо для кожної рівномірно розподіленої послідовності  $(x_n) \subseteq [0; 1]$ , послідовність  $(\varphi(x_n))$  також є рівномірно розподіленою.

Відомими [1] є наступні властивості:

1) якщо послідовність  $(x_n)$  рівномірно розподілена, то  $(x_n + \beta)$  також рівномірно розподілена, для довільного  $\beta \in \mathbb{R}$ ;

2) якщо  $(x_n)$  рівномірно розподілена і  $(y_n): \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \gamma - \text{const}$ , то  $(y_n)$  рівномірно розподілена;

3) якщо  $(x_n)$  рівномірно розподілена, то послідовність  $(mx_n)$  рівномірно розподілена, для кожного  $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

Відомо [3], що з існування границі

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(\{x_j\})$$

випливає, що  $f(x)$  є інтегрованою по Ріману функцією на відрізку  $[0; 1]$ , тобто маємо наслідок.

**Наслідок 1.** Якщо  $\varphi(x)$  володіє властивістю *SUD*, то множина точок розриву функції  $\varphi(x)$  має міру Лебега 0.

Сформулюємо необхідний критерій того, що функція володіє властивістю *SUD*.

**Теорема 2.** Для того, щоб функція  $\varphi(x)$  володіла властивістю *SUD* необхідно щоб виконувалась нерівність  $A(\varphi) \geq 1$ , де

$$A(\varphi) = \sup_{x \in [0; 1]} \varphi(x) - \inf_{x \in [0; 1]} \varphi(x).$$

*Доведення.* Припустимо, що  $A(\varphi) < 1$ . Можливі два випадки:

а) існує  $l \in \mathbb{Z}$  таке, що

$$l \leq \inf_{[0;1]} \varphi(x) < \sup_{[0;1]} \varphi(x) \leq l + 1.$$

Маємо:

$$\inf_{[0;1]} \varphi(x) = l + \alpha,$$

$$\sup_{[0;1]} \varphi(x) = l + \beta,$$

$$\beta - \alpha < 1,$$

$$0 \leq \alpha, \beta \leq 1.$$

Якщо  $\alpha = 0$ , то  $\beta < 1$  і  $\{\varphi(x)\} \in [0; \beta]$ .

Якщо  $\beta = 1$ , то  $\alpha > 0$  і  $\{\varphi(x)\} \in [\alpha; 1) \cup \{0\}$ , маємо суперечність.

б) існує  $l \in \mathbb{Z}$  таке, що

$$\inf_{[0;1]} \varphi(x) \leq l \leq \sup_{[0;1]} \varphi(x).$$

Таким чином:

$$\inf_{[0;1]} \varphi(x) = l - 1 + \alpha,$$

$$\sup_{[0;1]} \varphi(x) = l + \beta,$$

$$0 \leq \alpha, \beta \leq 1.$$

Якщо  $\alpha \in \{0; 1\}$  або  $\beta \in \{0; 1\}$ , то маємо випадок а), тому нехай  $\alpha, \beta \in (0; 1)$ .

Маємо:

$$\beta - (\alpha - 1) = \beta - \alpha + 1 < 1,$$

$$\beta < \alpha,$$

$$\{\varphi(x)\} \in [\alpha; 1) \cup [0; \beta] \neq [0; 1).$$

□ В подальшому будемо розглядати випадок, коли  $\varphi(x): [0; 1] \rightarrow [m; M]$ , де відповідно

$$m = \min_{[0;1]} (\varphi(x)), \quad M = \max_{[0;1]} (\varphi(x)).$$

**Теорема 3.** Лінійна функція  $\varphi(x) = kx + l$  володіє властивістю SUD тоді і тільки тоді, коли  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

*Доведення.* Якщо  $\varphi(x)$  володіє властивістю SUD, то

$$A(\varphi) = |k| \geq 1.$$

Нехай  $|k| \geq 1$ , тоді враховуючи властивості 1-3, достатньо розглянути випадок  $k \geq 1$  і  $l = 0$ . Якщо  $(x_n)$  рівномірно розподілена, то оскільки  $[kx_n] \in \{0; \dots; [k]\}$ , умова  $\{kx_n\} \in (a; b) \subseteq [0; 1]$  виконується тільки тоді, коли

$$[kx_n] = 0 \Rightarrow kx_n \in (a; b) \Rightarrow x_n \in \left(\frac{a}{k}; \frac{b}{k}\right) \cap \left[0; \frac{1}{k}\right) = \left(\frac{a}{k}; \frac{b}{k}\right);$$

$$\begin{aligned} [kx_n] = 1 \Rightarrow kx_n - 1 \in (a; b) \Rightarrow x_n \in \left(\frac{a+1}{k}; \frac{b+1}{k}\right) \cap \left[\frac{1}{k}; \frac{2}{k}\right) = \\ = \left(\frac{a+1}{k}; \frac{b+1}{k}\right); \end{aligned}$$

.....

$$\begin{aligned} [kx_n] = [k] \Rightarrow kx_n - [k] \in (a; b) \Rightarrow \\ x_n \in \left(\frac{a+[k]}{k}; \frac{b+[k]}{k}\right) \cap \left[\frac{[k]}{k}; \frac{[k]+1}{k}\right) = \left(\frac{a+[k]}{k}; \frac{b+[k]}{k}\right). \end{aligned}$$

Нехай  $a, b$  — достатньо малі додатні числа такі, що  $0 < a < b < [k]$ .

Маємо:

$$\frac{N_m(kx_n; (a; b))}{m} = \sum_{j=0}^{[k]} \frac{N\left(x_n; \left(\frac{a+j}{k}; \frac{b+j}{k}\right)\right)}{m} \rightarrow$$

$$\sum_{j=0}^{[k]} \left(\frac{b+j}{k} - \frac{a+j}{k}\right) = \frac{[k]+1}{k}(b-a) > b-a \quad (m \rightarrow \infty).$$

□

**Означення 4.** Функція, яка задана на деякому відрізку  $[a; b]$  і набуває на ньому найбільшого і найменшого значення, називається звивистою, якщо на кожному відрізку  $[c; d] \subset [a; b]$  вона набуває свого найбільшого та найменшого значення.

**Теорема 4.** Якщо функція  $\varphi(x)$  є неперервною та звивистою, то вона не володіє властивістю *SUD*.

*Доведення.* Зафіксуємо деяке  $a \in (m; M)$ . Розглянемо множину  $A = \{x \mid \varphi(x) = a\}$ . Припустимо, що існує інтервал  $(\alpha; \beta) \subset [0; 1]$ :

$$A \cap (\alpha; \beta) = \emptyset.$$

Однак з іншого боку існують  $\alpha^*, \beta^* \in (\alpha; \beta)$ :

$$\varphi(\alpha^*) = m, \varphi(\beta^*) = M.$$

і за теоремою Коші існує  $\gamma \in (\alpha^*; \beta^*)$ :

$$\varphi(\gamma) = a.$$

Маємо суперечність.

Нехай  $x_n = \{n\sqrt{2}\}$ , тоді зрозуміло, що  $(x_n)$  рівномірно розподілена. Будемо послідовно вибирати значення  $z_n, n \in \mathbb{N}$  наступним чином:

$$z_1 \in A: |x_1 - z_1| < \frac{1}{1},$$

$$z_2 \in A: |x_2 - z_2| < \frac{1}{2},$$

.....

$$z_k \in A: |x_k - z_k| < \frac{1}{k},$$

.....

Оскільки

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k - z_k) = 0,$$

то послідовність  $(z_k)$  рівномірно розподілена, але тоді  $\varphi(z_k) = a$  і  $(\varphi(z_k))$  не є рівномірно розподіленою.  $\square$  Наступна теорема доповнює попередню.

**Теорема 5.** Якщо  $\varphi(x)$  є неперервною та звивистою і  $A(\varphi) \geq 1$ , то існує послідовність  $(x_n) \subseteq [0; 1]$  така, що послідовності  $(x_n)$  та  $(\varphi(x_n))$  одночасно є рівномірно розподіленими.

*Доведення.* Зрозуміло, що знайдуться  $l \in Z, \alpha \in R$  такі, що

$$\varphi(x) \in [l + \alpha; l + 1 + \alpha] \forall x \in [0; 1].$$

Розглянемо множини

$$A_n = \{x \mid \varphi(x) = l + \alpha + \{n\sqrt{2}\}\}.$$

Зрозуміло, що множини  $A_n$  є всюду щільними на відрізку  $[0; 1]$ , для кожного натурального  $n$ . Побудуємо послідовність  $(z_n)$  наступним чином:

$$z_1 \in A_1: |z_1 - y_1| < \frac{1}{1},$$

$$z_2 \in A_2: |z_2 - y_2| < \frac{1}{2},$$

.....

$$z_k \in A_k: |z_k - y_k| < \frac{1}{k},$$

.....,

де  $y_k = \{k\sqrt{3}\}$  для кожного натурального  $k$ .

Оскільки

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (z_k - y_k) = 0,$$

і послідовність  $(y_k)$  рівномірно розподілена, то зрозуміло, що  $(z_k)$  також рівномірно розподілена. Оскільки  $\varphi(z_k) = l + \alpha + \{k\sqrt{2}\}$  маємо потрібне.  $\square$

**Теорема 6.** Якщо функція розподілу  $\varphi(x)$  задовольняє властивість SUD і  $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = 1$ , то  $\varphi(x) = x$  для кожного  $x \in [0; 1]$ .



*Доведення.* Якщо функція  $\varphi(x)$  не є строго зростаючою на відрізку  $[0; 1]$ , то існують  $x_1 < x_2$ :  $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = \lambda$  і відповідно  $\varphi(x) = \lambda$  для кожного  $x \in [x_1; x_2]$ .

Розглянемо рівномірно розподілену послідовність:

$$a_n = \begin{cases} \lambda, & n = 1; \\ \{n\sqrt{2}\}, & n \geq 2, n \in N. \end{cases}$$

Оскільки  $\varphi(a_n)$  рівномірно розподілена, то

$$\frac{N_m(\varphi(a_n); [\lambda; \lambda])}{m} \rightarrow \lambda - \lambda = 0 \quad (m \rightarrow \infty),$$

а з іншого боку

$$\frac{N_m(\varphi(a_n); [\lambda; \lambda])}{m} = \frac{N_m(a_n; [x_1; x_2])}{m} \rightarrow x_2 - x_1 \quad (m \rightarrow \infty).$$

Суперечність. Отже,  $\varphi(x)$  строго зростає на  $[0; 1]$ . Маємо:

$$\frac{N_m(a_n; (0; x))}{m} = \frac{N_m(\varphi(a_n); (\varphi(0); \varphi(x)))}{m}.$$

Спрямувавши  $m \rightarrow \infty$ , маємо:  $x = \varphi(x)$ . □

**Теорема 7.** *Якщо функція  $\varphi: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  має критичну точку і є неперервною в околі цієї точки, то  $\varphi(x)$  не володіє властивістю SUD.*

*Доведення.* Нехай  $\varphi'(x_0) = 0$  для деякого  $x_0 \in (0; 1)$ . Виберемо достатньо мале  $\varepsilon > 0$ . Зрозуміло, що

$$\frac{N_m(\varphi(x_n); (\varphi(x_0 - \varepsilon); \varphi(x_0)))}{m} \geq \frac{N_m(x_n; (x_0 - \varepsilon; x_0))}{m}.$$

Спрямувавши  $m \rightarrow \infty$ , маємо:

$$\varphi(x_0) - \varphi(x_0 - \varepsilon) \geq \varepsilon,$$

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x_0 - \varepsilon)}{\varepsilon} \geq 1.$$

Спрямувавши  $\varepsilon \rightarrow 0$ , маємо:

$$\varphi'(x_0) \geq 1.$$

Суперечність. □

**Теорема 8.** Якщо неперервна функція  $\varphi: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  володіє властивістю *SUD*, то  $\varphi(x) \equiv x$ .

*Доведення.* Нехай  $(x_n)$  рівномірно розподілена, тоді

$$\frac{N_m(\varphi(x_n); (\varphi(0); \varphi(t)))}{m} \geq \frac{N_m(x_n; (0; t))}{m}.$$

Спрямувавши  $m \rightarrow \infty$ , маємо

$$\varphi(t) - \varphi(0) \geq t \Rightarrow \varphi(t) \geq t + \varphi(0).$$

Якщо  $\varphi(0) > 0$ , то  $\varphi(1) \geq 1 + \varphi(0) > 1$  і маємо суперечність. Отже,

$$\varphi(0) = 0$$

і

$$\varphi(t) \geq t \quad \forall t \in [0; 1].$$

Позначимо

$$\varphi(x_n) = y_n$$

і

$$\Delta(x) = \varphi(x) - x,$$

тоді  $\Delta(x) \geq 0$  для кожного  $x \in [0; 1]$  і функція  $\Delta(x)$  неперервна. За критерієм Вейля

$$\frac{y_1 + \dots + y_n}{n} \rightarrow \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \quad (n \rightarrow \infty),$$

але з іншого боку

$$\frac{y_1 + \dots + y_n}{n} = \frac{\varphi(x_1) + \dots + \varphi(x_n)}{n} \rightarrow \int_0^1 \varphi(x) dx \quad (n \rightarrow \infty).$$

Маємо:

$$\int_0^1 \varphi(x) dx = \frac{1}{2},$$

$$\int_0^1 (x + \Delta(x)) dx = \frac{1}{2},$$

$$\int_0^1 \Delta(x) dx = 0.$$

Оскільки,  $\Delta(x)$  — неперервна,  $\Delta(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0; 1]$ , то  $\Delta(x) \equiv 0$ . □

### 3. Дискретні динамічні системи з рівномірно розподіленими орбітами.

Розглянемо функцію  $\varphi: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  таку, що

$$\min_{[0;1]} \varphi(x) = 0, \max_{[0;1]} \varphi(x) = 1.$$

Для заданого  $t \in [0; 1]$  можливо розглянути орбіти:

$$x_n(t) = \underbrace{\varphi(\varphi(\dots(\varphi(t))\dots))}_n,$$

для динамічної системи  $(X; \varphi(x))$  з фазовим простором  $X = ([0; 1]; \mathbb{R}^1)$ .

Природним питанням є дослідження множини  $M(\varphi)$  точок  $t \in [0; 1]$ , таких, що послідовність  $x_n(t)$  є рівномірно розподіленою, для заданої функції  $\varphi(x)$ .

Якщо  $\varphi$  є неперервною, то  $[0; 1] \setminus M(\varphi) \neq \emptyset$ . Дійсно, для деяких  $\alpha, \beta \in [0; 1]$ :  $\varphi(\alpha) = 0$ ,  $\varphi(\beta) = 1$ , тому для неперервної функції  $g(x) = \varphi(x) - x$  маємо:

$$g(\alpha) = -\alpha \leq 0, \quad g(\beta) = 1 - \beta \geq 1.$$

Отже, за теоремою Коші  $g(\gamma) = 0$ , для деякого  $\gamma \in [0; 1]$ , тобто  $\varphi(\gamma) = \gamma$  ( $\gamma$  – нерухомою точкою) і  $x_n(\gamma)$  є сталою послідовністю.

Нехай  $g: \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots}^{Q_2} \rightarrow \Delta_{\alpha_2 \alpha_3 \dots}^{Q_2}$ . Легко бачити, що

$$g(t) = \begin{cases} \frac{t}{q_0}, & t \in [0; q_0), \\ \frac{t - q_0}{q_1}, & t \in [q_0; 1]. \end{cases}$$

Нехай

$$x = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots}^{Q_2}.$$

**Означення 5.** Число  $x$  будемо називати  $Q_2$ -слабонормальним, якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(x; 0)}{n} = q_0,$$

де  $N_n(x; 0)$  – кількість нулів серед чисел  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ .

**Означення 6.** Число  $x$  будемо називати  $Q_2$ -нормальним, якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(x; (\gamma_1; \gamma_2; \dots; \gamma_k))}{n} = \prod_{j=1}^k q_{\gamma_j},$$

де  $N_n(x; (\gamma_1; \gamma_2; \dots; \gamma_k))$  – кількість блоків  $(\gamma_1; \dots; \gamma_k)$  серед чисел  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . (якщо бути точним, це кількість номерів  $j \in \{1; \dots; n - k - 1\}$  таких що  $\alpha_{j+i-1} = \gamma_i$  для кожного  $i \in \{1; \dots; k\}$ ).

Зрозуміло, що кожне  $Q_2$ -нормальне число є  $Q_2$ -слабонормальним. Протилежне твердження хибне, наведемо відповідний приклад.

Нехай  $n_0 \in N$  таке, що значення  $a_n = [nq_0], b_n = [nq_1]$  більші за 2 для кожного натурального  $n \geq n_0$ .

Розглянемо число

$$y = \Delta^{Q_2} \underbrace{0 \dots 0}_{a_{n_0}} \underbrace{1 \dots 1}_{b_{n_0}} \dots \underbrace{0 \dots 0}_{a_{n_k}} \underbrace{1 \dots 1}_{b_{n_k}} \dots$$

Для достатньо великого натурального  $l$  знайдеться номер  $n(l)$  такий, що

$$\sum_{j=n_0}^{n(l)} (a_j + b_j) \leq l < \sum_{j=n_0}^{n(l)+1} (a_j + b_j).$$

Маємо:

$$\begin{aligned} \frac{N_l(x; 0)}{l} &\geq \frac{\sum_{j=n_0}^{n(l)} a_j}{\sum_{j=n_0}^{n(l)+1} (a_j + b_j)} \geq \frac{q_0 \sum_{j=n_0}^{n(l)} j - (n(l) - n_0 + 1)}{\sum_{j=n_0}^{n(l)+1} (q_0 + q_1) \cdot j} = \\ &= \frac{q_0 \left( \frac{n(l)(n(l)+1)}{2} - \frac{(n_0-1)n_0}{2} \right) - (n(l) - n_0 + 1)}{\frac{(n(l)+1)(n(l)+2)}{2} - \frac{(n_0-1)n_0}{2}} \rightarrow q_0 \quad (l \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

З іншого боку

$$\frac{N_l(x; 0)}{l} \leq \frac{\sum_{j=n_0}^{n(l)+1} a_j}{\sum_{j=n_0}^{n(l)} (a_j + b_j)} \leq \frac{q_0 \sum_{j=n_0}^{n(l)+1} j}{\sum_{j=n_0}^{n(l)} (q_0 + q_1) \cdot j - (n(l) - n_0 + 1)} =$$

$$= \frac{q_0 \left( \frac{(n(l)+1)(n(l)+2)}{2} - \frac{(n_0-1)n_0}{2} \right)}{\frac{(n(l)+1)n(l)}{2} - (n(l) - n_0 + 1)} \rightarrow q_0 \quad (l \rightarrow \infty).$$

Отже,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(y; 0)}{n} = q_0,$$

і  $y \in Q_2$ -слабонормальним числом, однак воно не є  $Q_2$ -нормальним, адже блок цифр  $(0; 1; 0; 1)$  взагалі не зустрічається.

Відрізок

$$\Delta(\gamma_1; \gamma_2; \dots; \gamma_l) = \left[ \Delta_{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_l}^{Q_2}(0); \Delta_{\gamma_1 \gamma_2 \dots \gamma_l}^{Q_2}(1) \right]$$

будемо називати  $Q_2$ -циліндром  $n$ -го рангу.

**Лема 9.** *Нехай  $M$  — множина всіх  $Q_2$ -циліндрів  $n$ -го рангу для кожного натурального  $n$ . Послідовність  $(x_n)$  є рівномірно розподіленою тільки тоді, коли*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n(x_n; A)}{n} = \lambda(A),$$

для кожної множини  $A \in M$ , де  $\lambda(\cdot)$  — міра Лебега і  $N_n(x_n; A)$  — кількість чисел серед  $\{x_1\}, \{x_2\}, \dots, \{x_n\}$ , які належать множині  $A$ .

*Доведення.* Якщо  $(x_n)$  рівномірно розподілена, то очевидно відповідна рівність виконується для кожної множини  $A \in M$ .

Розглянемо проміжок  $[a; b]$ , де  $a > 0$  і  $b < 1$  (випадок  $a = 0$  або  $1$  розглядаються аналогічним чином).

Нехай

$$a = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots}^{Q_2}, b = \Delta_{\beta_1 \beta_2 \dots}^{Q_2}.$$

Розглянемо послідовність відрізків

$$C_n = \left[ \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}^{Q_2} \quad b = \Delta_{\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n}^{Q_2} \right].$$

Зрозуміло, що знайдеться набір  $Q_2$ -циліндрів  $n$ -го рангу

$$\Delta \left( \eta_1^{(1)}; \eta_2^{(1)}; \dots; \eta_n^{(1)} \right), \dots, \Delta \left( \eta_1^{(j)}; \eta_2^{(j)}; \dots; \eta_n^{(j)} \right),$$

такі, що

$$C_n = \bigcup_{i=1}^j \Delta \left( \eta_1^{(i)}; \eta_2^{(i)}; \dots; \eta_n^{(i)} \right).$$

Маємо:

$$\begin{aligned} \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{N_l(x_k; C_n)}{l} &= \sum_{r=1}^j \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{N_l \left( x_k; \Delta \left( \eta_1^{(r)}; \dots; \eta_n^{(r)} \right) \right)}{l} = \\ &= \sum_{r=1}^j \lim_{l \rightarrow \infty} \lambda \left( \Delta \left( \eta_1^{(r)}; \dots; \eta_n^{(r)} \right) \right) = \lambda(C_n). \end{aligned}$$

Аналогічно доводиться, що

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{N_l(x_k; \tilde{C}_n)}{l} = \lambda(\tilde{C}_n),$$

де

$$\tilde{C}_n = \left[ \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n(1)}^{Q_2} b = \Delta_{\beta_1 \beta_2 \dots \beta_n(0)}^{Q_2} \right].$$

Оскільки

$$\frac{N_l(x_k; \tilde{C}_n)}{l} \leq \frac{N_l(x_k; (a; b))}{l} \leq \frac{N_l(x_k; C_n)}{l} \quad \forall n \in N,$$

то перейшовши до границі  $l \rightarrow +\infty$  і врахувавши, що

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \lambda(C_l) = b - a = \lim_{l \rightarrow \infty} \lambda(\tilde{C}_l),$$

отримаємо:

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \frac{N_l(x_k; (a; b))}{l} = b - a.$$

□

**Теорема 10.** Число

$$z = \Delta_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots}^{Q_2}$$

є  $Q_2$ -нормальним тільки тоді, коли послідовність  $(g_n(z))$  є рівномірно розподіленою.

*Доведення.* Нехай  $(g_n(z))$  рівномірно розподілена. Зрозуміло, що  $N_n(g_k(z); \Delta(\gamma_1; \gamma_2; \dots; \gamma_l))$  дорівнює кількості блоків  $(\gamma_1; \gamma_2; \dots; \gamma_l)$  серед цифр  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ , тому що число  $\Delta_{\eta_1 \eta_2 \dots}^{Q_2}$  належить відрізку  $\Delta(\gamma_1; \gamma_2; \dots; \gamma_l)$  лише тоді, коли  $\eta_r = \gamma_r$  для кожного  $r \in \{1; \dots; l\}$ .

Маємо:

$$\frac{N_n(z; (\gamma_1; \dots; \gamma_l))}{n} = \frac{N_n(g_k(z); \Delta(\gamma_1; \dots; \gamma_l))}{n} \rightarrow \lambda(\Delta(\gamma_1; \dots; \gamma_l)) = \prod_{j=1}^l q_{\gamma_j} (n \rightarrow +\infty),$$

тобто  $z \in Q_2$ -нормальним.

Нехай  $z \in Q_2$ -нормальним, тоді для кожного  $Q_2$ -циліндра  $\Delta(\gamma_1; \dots; \gamma_l)$  маємо:

$$\begin{aligned} \frac{N_n(g_k(z); \Delta(\gamma_1; \dots; \gamma_l))}{n} &= \frac{N_n(z; (\gamma_1; \dots; \gamma_l))}{n} \rightarrow \prod_{j=1}^l q_{\gamma_j} = \\ &= \lambda(\Delta(\gamma_1; \dots; \gamma_l))(n \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

і на основі попередньої леми отримуємо потрібне.  $\square$

## Література

- [1] Кейперс Л., Ниддерейтер Г. Равномерно распределение последовательностей: Пер.с англ./ Под ред. С. М. Ермакова. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 408 с.
- [2] Турбин А.Ф., Працевитый Н.В. Фрактальные множества, функции, распределения // Киев: Наук.думка. – 1992. – 2008 с.
- [3] De Bruijn N.G., Post K. A. A remark on uniformly distributed sequences and Riemann integrability // Indag.Math. – 1968. – 30. – p.149-150.



- 
- [4] *Borel.E* Les probabilités denombables et leurs applications arithmetiques. — Rend. Circ. Mat. Palermo, 1909, p. 247-271.
  - [5] *Borel.E* Lecons sur la theorie des fonctions // 2nd ed. — Paris: Gauthier — Villars. — 1914.
  - [6] *Weil.H* Über die Gibbssche Erscheinung und verwandte Konvergenzphanomene // Rend. Circ. Math. Palermo. — 1910. — 30. — P. 377-407.
  - [7] *Weil.H* Über ein Problem aus dem Gebiete der diophantischen Approximationen // Nachr. Ges. Wiss. Gottingen, Math.-phys. Kl. — 1914, P. 234-244
  - [8] *Weil.H* Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins // Math. Ann. — 1916. — 77. — P. 313-352.
  - [9] *Niven I., Zuckerman H.S.* On the definition of normal numbers // Pacific J. Math. — 1951. — 1. — P. 103-109.
  - [10] *Ries F.* Sur la theorie ergodique // Comment. Math. Helv., 1944/45. — 17. — P. 221-239.